



ESTRAZIONE DEL CASCO

- E' una semplice e utile manovra che ogni soccorritore deve saper mettere in pratica
- Occorrono due operatori con buona precisione e delicatezza e una buona capacità di coordinamento in team
- Togliere il casco ad un paziente traumatizzato richiede particolare attenzione, ma trasportare un paziente con il casco é inutile e pericoloso nella maggior parte dei casi.

FASE 1

- Il primo soccorritore si pone in ginocchio dietro la testa del paziente assumendo una posizione stabile
- Afferra le pareti del casco con il palmo delle mani tenendo il bordo inferiore con la punta delle dita, senza alterare la posizione del casco



FASE 2

- Il secondo soccorritore si pone in ginocchio al fianco del paziente all'altezza del torace
- Slaccia o taglia il fissaggio mentoliero del casco
- Apre la visiera se chiusa



FASE 3

- Il secondo soccorritore afferra il cranio del paziente infilando le mani nel casco
- Una mano afferra da sotto l'osso occipitale
- L'altra mano con il pollice e l'indice ai lati della bocca afferra gli zigomi



FASE 4

- Il secondo soccorritore comunica al primo di iniziare la manovra di estrazione
- Il primo soccorritore afferra con decisione il casco e ne comprime l'imbottitura interna per non interferire nel passaggio delle orecchie
- Il primo soccorritore inizia a tirare il casco verso se, delicatamente, facendolo beccheggia
- Il secondo soccorritore con la mano sotto la testa e l'altra a serrare gli zigomi, mantiene il capo del paziente in posizione neutra



FASE 5

- Raggiunto il naso del paziente il primo soccorritore diminuisce il beccheggio
- Continua la manovra fino a estrazione completa facendo attenzione che i capelli del paziente non rimangano incastrati nel casco
- Se i capelli sono lunghi sarà cura del secondo soccorritore bloccarli con la stessa mano che sorregge l'osso occipitale



FASE 6

- Una volta estratto il casco il soccorritore non abbandona ancora il cranio
- Il primo soccorritore, se necessario, porrà un sostegno sotto il capo del paziente per mantenere in posizione neutra il rachide cervicale



FASE 7

- Il primo soccorritore ora afferra con i pollici gli zigomi del paziente, passando le altre dita sotto l'osso occipitale
- Mantiene così un allineamento neutro e stabile della colonna del paziente



FASE 8

- Il secondo soccorritore lascia la presa sul cranio quando è sicuro che questa è garantita dal collega
- Prende il collare cervicale
- Posiziona il collare cervicale al paziente

